

Informacija pacientams

Deltyba™ ▼ (delamanido) vartojimas nėštumo ar žindymo laikotarpiu

▼ Vykdoma papildoma šio vaisto stebėseną. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. www.vvkt.lt.

Jums buvo diagnozuota sunki bakterijų sukelta infekcinė liga, vadinama daugeliui vaistų atsparia tuberkuloze (DVA-TB). Gydytojas nusprendė Jus gydyti keliais skirtingais antibiotikais, įskaitant naują antibiotiką, vadinamą Delyba (delamanidu). Visų šių antibiotikų kartu vartojama tam, kad Jūsų būklė pagerėtų.

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kadangi jame pateikiama svarbios informacijos apie Delyba (delamanido) vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Šis vadovas neatstoja pokalbio su gydytoju apie Jūsų ligą ar gydymą. Būtinai perskaitykite ir supraskite kartu su vaistu tiekiamo pakuotės lapelio informaciją bei aptarkite savo gydymą su gydytoju prieš pradėdama vartoti Delyba (delamanidą).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu Delyba (delamanido) vartojimo metu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant nenurodytą pakuotės lapelyje, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje <https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv>;
- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama <https://www.vvkt.lt/index.php?4004286486>, ir atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt);
- Nemokamu telefonu 8 800 735 68.

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

Ką aš turiu žinoti apie Delyba (delamanido) vartojimą nėštumo ar žindymo laikotarpiu?

Toliau pateikiama svarbi informacija, kurią turite žinoti prieš pradėdama vartoti Delyba (delamanidą).

- Delyba (delamanidas) gali pakenkti dar negimusiam vaikui.
- Jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, apie tai nedelsdama pasakykite gydytojui ir vykdykite jo nurodymus.
- Delyba (delamanido) vartojimo laikotarpiu turite naudoti veiksmingą kontracepcijos metodą nėštumui išvengti.
- Jeigu gydymo Delyba (delamanidu) metu pastosite, turite nedelsdama kreiptis į gydytoją ir susitarti dėl susitikimo.
- Jeigu Jūs maitinate krūtimi, žindymą turite pakeisti maitinimu buteliuku prieš gydymo Delyba (delamanidu) pradžia, kadangi vaisto per pieną gali patekti į Jūsų vaiko organizmą.

Būtinai perskaitykite visą kartu su Delyba (delamanidu) tiekiamą pakuotės lapelį, nes jame pateikiama visa svarbi informacija, kurią turite žinoti apie šį vaistą.

Jei ko nors nesuprasite, paprašykite gydytojo ar slaugytojo, kad paaiškintų ar atsakytų į bet kokius Jums galinčius kilti klausimus.

Daugiau informacijos

Šią informacinę brošiūrą pacientams galima rasti registruotojo internetinėje svetainėje:

<https://otsuka-onpg.com/about-our-product-against-mdr-tb>

Paruošė:
Otsuka Novel Products GmbH
Erika-Mann-Straße 21
80636 Munich
Vokietija

