

Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu

Deltyba™ ▼ (delamanīda) lietošana grūtniecības vai barošanas ar krūti laikā

▼ Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādam novērotajām blakusparādībām.

Jums tika diagnosticēta smaga bakteriāla infekcija, ko sauc par multirezistentu tuberkulozi (MR-TB). Jūsu ārsts nolēma ārstēt Jūs ar vairākām dažādām antibiotikām, tostarp ar jaunu antibiotiku, ko sauc Delyba (delamanīds). Visas šīs antibiotikas jālieto kopā, lai panāktu Jūsu veselības uzlabošanu.

Lūdzu, izlasiet šo pamācību rūpīgi, jo tā sniegs Jums svarīgu informāciju par Delyba (delamanīda) lietošanu grūtniecības laikā vai laikā, kad barojat bērnu ar krūti. Šīs pamācības izlasīšana neaizstāj sarunu ar ārstu par Jūsu slimību vai par tās ārstēšanu. Lūdzam pārliecināties, ka izlasījāt un sapratāt zāļu iepakojumā esošajā pacienta informācijas lapā rakstīto, un ka pirms Delyba (delamanīda) lietošanas sākuma Jūs esat apspriedusi savu ārstēšanu ar Jūsu ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Delyba (delamanīda) lietošanas laikā Jums rodas jebkādas blakusparādības, apspriedieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz jebkādām tādām iespējamām blakusparādībām, kuras nav minētas zāļu iepakojumā esošajā informācijas lapā.

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties “Pacientiem”. Tālrunis informācijai: 67078400.

Kas man jāzina par Delyba (delamanīda) lietošanu grūtniecības laikā vai laikā, kad baroju bērnu ar krūti?

Pirms uzsākt ārstēšanos ar Delyba (delamanīdu), ir svarīgi zināt, ka:

- Delyba (delamanīds) var kaitēt Jūsu vēl nedzimušajam bērnam.
- Ja Jūs esat grūtniece, domājiet, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, nekavējoties informējiet par to savu ārstu un sekojiet viņa norādījumiem.
- Delyba (delamanīda) lietošanas laikā Jums jāizmanto efektīvas kontracepcijas metodes, lai nepieļautu grūtniecības iestāšanos.
- Ja konstatējat, ka ārstēšanās laikā ar Delyba (delamanīdu), Jums ir iestājusies grūtniecība, informējiet savu ārstējošo ārstu par grūtniecību un nekavējoties pierakstieties uz vizīti.
- Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, tad, pirms uzsākt ārstēšanos ar Delyba (delamanīdu), Jums jāpāriet uz barošanu ar maisījumu, jo bērns var uzņemt zāles ar Jūsu pienu.



Lūdzu, pārlicinieties, ka pilnībā izlasījāt lietošanas instrukciju, kas atrodas Delyba (delamanīda) iepakojumā. Tajā ir ietverta visa būtiskā informācija, kas Jums jāzina par šīm zālēm. Lūdziet savu ārstu vai medmāsu paskaidrot Jums visu, ko nesaprotat vai atbildēt uz visiem Jūsu iespējamiem jautājumiem.

Vairāk informācijas

Šī informācijas brošūra pacientiem ir pieejama reģistrācijas apliecības
īpašnieka tīmekļa vietnē:

<https://otsuka-onpg.com/about-our-product-against-mdr-tb>.

Sagatavots

Otsuka Novel Products GmbH
Erika-Mann-Strasse 21
80636 Minhene
Vācija